



Delirium

o síndrome confusional agudo en personas con demencia

Elaborado por el equipo Multidisciplinario de Alzheimer México, I.A.P.





Aliados que inspiran y hacen posible esta iniciativa


















Gracias a su confianza y generosidad, esta iniciativa llega a más familias, llevando información, esperanza y acción en la lucha contra el Alzheimer y otras demencias.

Conócenos, aprende y dona en **alzmx.org**



Hablar de delirium, se torna importante cuando se superpone a la demencia, pues a menudo no se diagnostica o se diagnostica erróneamente como el empeoramiento de los síntomas de la demencia o depresión.

Debido a que comparten algunos puntos en común, existe dificultad para reconocerlo y tratarlo de forma temprana, especialmente cuando ocurre en personas con demencia.





¿Cómo identificarlo?

Existen una serie de síntomas que ayudan a reconocerlo, estos son:

Es de inicio súbito, es decir, comienza en unas horas o días

(02)

De curso fluctuante; es decir; existe un empeoramiento vespertino de los síntomas

Presenta alteraciones en el estado de alerta (dificultad para mantenerse activo en una actividad), la atención (se distraen con facilidad), percepción y pensamiento (dificultades para comprender instrucciones y desconocimiento de personas familiares).

(04)

Puede presentar alteraciones psicomotoras (hipo o hiperactividad).

Se encuentra directamente relacionado a una causa, sea una alteración médica o el consumo de un agente químico. Carece de una etiología específica.

(06)

La mayoría de los casos se recuperan en cuatro semanas o menos. Sin embargo, no es raro, que persista con fluctuaciones incluso durante 6 meses. sueño-vigilia: en casos graves, pérdida total del sueño o inversión de las fases del ciclo del sueño-vigilia, somnolencia diurna, pesadillas desagradables que pueden prolongarse durante la vigilia en forma de alucinaciones.

Trastorno del ciclo



La clave para comprender y reconocer los síntomas del delirium y la demencia, especialmente aquel que se superpone a la demencia, está en sus diferencias.

La confusión y la desorientación se consideran los síntomas distintivos tanto del delirium como de la demencia. El nivel de confusión y orientación en una persona con demencia tarda meses en cambiar, pero de horas a días en el delirium.



¿Qué lo puede provocar?

Entre las causas posibles se incluyen las siguientes:



Entre otras posibles causas se incluyen las siguientes: Caídas, dolor, privación del sueño, desequilibrios metabólicos, dejar de comer, deshidratación y mezcla de bebidas alcohólicas con fármacos



Al ser potencialmente prevenible y tratable, es necesario saber cómo actuar cuando se presenta esta condición. Existen tres pilares del manejo de la persona con delirio:

Garantizar la seguridad de la persona



Proveer tratamiento adecuado a las causas



Manejar los síntomas





Coordinación de Enfermería

- Prevenir escarificación de la piel.
- Brindar atención a las necesidades fisiológicas de la persona.
- Evite procedimientos médicos y de enfermería durante la noche.
- Evite horarios de medicación inapropiados.
- Disminuya el ruido al mínimo en periodos de sueño.
- Evite las siestas durante el día y promueva patrones normales de sueño






Coordinación de Neuropsicología

Para las alteraciones cognoscitivas o de desorientación:


- Provea adecuada iluminación natural y señalización clara en la habitación, procure tener disponible a la vista de la persona un reloj y un calendario.
- Oriente a la persona frecuentemente, explicándole quién es y dónde está.
- Realice actividades que lo estimulen afectiva y cognitivamente.
- Procure que las actividades sean de su gusto e interés.
- Facilite la visita de familiares y amigos.





Coordinación de Nutrición

- Brinde adecuados suplementos y ajuste la dieta a la cultura de la persona.
- Asegúrese que las prótesis dentales calcen perfectamente.
- Anime a la familia a estar presente en hora de alimentación.
- Procure mantener una adecuada hidratación. Anime a la persona a beber agua, considere líquidos endovenosos en caso de que no sea posible beber.





Coordinación de Gericultura


- Asegúrese de que las ayudas visuales y auditivas están disponibles correctamente para la persona, tales como lentes y audífonos según lo requiera.
- Es importante reorientar regularmente a la persona y limitar los cambios de ubicación y de cuidador.
- Se sugiere que el familiar/cuidador tranquilice y reoriente a la persona. Además, se puede complementar con apoyo psicosocial y terapia ocupacional.





Coordinación de Fisioterapia

- Las restricciones físicas no son recomendadas, ni en personas en riesgo, ni en las que ya han desarrollado delirium, pues se asocian mayor severidad de este y con lesiones físicas
- Proveer una movilidad segura previniendo caídas.
- Generar una respiración lenta, suave, profunda y agradable, ayuda a la disminución de ansiedad, produciendo una sensación de calma y bienestar





Coordinación de Trabajo Social

 Tener su archivo de salud en orden, como son: carné de citas, recetas, datos de médico o servicio de salud por si es necesario solicitar consulta u optar por trasladarle al servicio de urgencias.

 Informar a la familia de lo que acontece para hacer una red de apoyo entre ustedes y que el cuidador primario reciba apoyo y compañía, ya que es difícil cuidar y trasladar a un adulto mayor en delirium.





Habitualmente, los síntomas del delirium se desarrollan en cuestión de horas o días. Pueden iniciar con síntomas aislados para después integrarse el síndrome hacia el tercer día. La resolución del cuadro depende de las condiciones de la persona, en especial en aquellos con alteraciones psiquiátricas previas. Si se corrige o se autolimita pronto la causa, es probable la recuperación completa.

Si te interesa conocer más a cerca de este tema, acércate con nosotros, podemos brindarte asesorías e información para seguir fortaleciendo tus habilidades como cuidador. Recuerda que conocer y apropiarnos de estos temas nos ayudan a brindar un cuidado oportuno.





Delirium

o síndrome confusional agudo en personas con demencia

Alzheimer México I.A.P. Una esperanza de vida.

Calle Moneda #90 Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000 Del. Tlalpan, CDMX

5280-4202 5280-3349 alzmx.org